

ZIRAM 76 GRANUFLO®

FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES – WG
REGISTRO NACIONAL ICA No PL0006782023

Titular del Registro:
CLABEREP LTDA – CLABE REPRESENTACIONES COLOMBIANAS LTDA

ZIRAM 76 GRANUFLO es un fungicida para aplicación foliar de contacto con acción preventiva.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingredientes Activos:

Ziram.....760 g/L
 (dimetil-ditiocarbamato de zinc) de formulación a 20 °C

Ingredientes Aditivosc.s.p. 1 Kg

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD QUE CONTROLA	DOSIS Y VOLUMEN DE MEZCLA	P.C.	PR
PAPA	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	2.5 kg/ha ¹	7 días	4 Horas
	Gota o tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)			
TOMATE	Gota o tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.5 kg/ha ²	14 días	4 Horas
PLATANO	Sigatoka Negra (<i>Mycosphaerella jijiensis</i> var. <i>jijiensis</i>)	2.5 kg/ha	14 días	4Horas ³
ARROZ	Piricularia (<i>Pyricularia oryzae</i>)	2 – 2.5 kg/ha	7 días	4 Horas
	Complejo Manchado del Grano (<i>Helminthosporium oryzae</i> , <i>Cercospora Oryzae</i> , <i>Alternaria padwickii</i>)	2.25 – 2.5 kg/ha		
ORNAMENTALES ⁴				
ROSA	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>) 2 g/Litro de agua ⁵ equivalente a 2 kg/Ha		N/A	4 Horas

¹ Volumen de mezcla: 500 litros/ha

² Volumen de mezcla: 400 litros/ha

³ Se acoge al párrafo segundo, numeral 4.2 de la Resolución 30058 del 14 de Agosto de 2018, correspondiente al método 2: Por evaluación del Riesgo donde menciona: “*Se podrá ingresar al cultivo dos (2) horas después de la aplicación del plaguicida ZIRAM 76 GRANUFLO, siempre y cuando exista previa autorización del agrónomo responsable técnico del cultivo, que verifique que el follaje esté seco y se utilicen los elementos de protección personal descritos en la etiqueta para la aplicación del producto*”

⁴ Se realizó prueba de Fitotoxicidad en Clavel

⁵ Volumen de mezcla: 1000 litros/ha

P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

EN CASO DE QUE EL CULTIVO O SUS SUBPRODUCTOS SE DESTINEN A LA EXPORTACIÓN SE DEBERÁ CONOCER EL LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS DEL PAÍS DE DESTINO O OBSERVAR EL PERIODO DE CARENCIA QUE CORRESPONDA A ESE VALOR DE TOLERANCIA.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA - EPOCA DE APLICACIÓN

Al aplicar **ZIRAM 76 GRANUFLO** lea detenidamente la etiqueta. Aplicar las dosis recomendadas cuando el Ingeniero Agrónomo lo recomiende, dependiendo de la incidencia de la enfermedad

Esperar que el rocío se seque antes de aplicar el producto, para no diluir el producto y no disminuir la concentración aplicada y en condiciones climáticas apropiadas; no aplicar en horas de máxima insolación.

ZIRAM 76 GRANUFLO es un producto soluble en agua, por lo cual se puede mezclar muy bien, sin necesidad de utilizar agitadores mecánicos. Se deben emplear aguas no duras y que estén libres de tierra o lodos.

ZIRAM 76 GRANUFLO, debe aplicarse por vía terrestre utilizando bombas de espalda o estacionarias siguiendo los métodos de calibración recomendados por el respectivo fabricante, utilizando la dosis recomendada por el ingeniero agrónomo de conformidad con el nivel de infestación del cultivo.

Llene con agua el tanque de mezcla hasta 2/3 de su capacidad con agua, lentamente vierta en su interior la dosis requerida de **ZIRAM 76 GRANUFLO**, posteriormente completar el llenado del tanque con agua, con permanente agitación hasta lograr una completa dispersión y aplicar la mezcla obtenida inmediatamente.

El fungicida **ZIRAM 76 GRANUFLO** es un líquido altamente soluble en agua, el cual se mezcla fácilmente formando una solución uniforme y estable.

CONSULTE CON EL INGENIERO AGRÓNOMO.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

COMPATIBILIDAD: Se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad en pequeñas áreas antes de realizar mezclas de agroquímicos. **NO DEBE SER MEZCLADO CON PRODUCTOS QUE CONTENGAN HIERRO, COBRE, MERCURIO, TEPP, OXIDO DE CALCIO (CAL) Y ARSENIATO DE CALCIO**

FITOTOXICIDAD: **ZIRAM 76 GRANUFLO** no es fitotóxico a las dosis recomendadas en esta etiqueta.

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS Y CULTIVOS SUCESIVOS

ZIRAM 76 GRANUFLO no tiene ningún efecto perjudicial sobre cultivos sucesivos ni sobre otros cultivos, sin embargo, para evitar la resistencia que puedan presentar las enfermedades se debe tener en cuenta un programa especial de manejo integrado de los cultivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular del Registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

PICTOGRAMAS SOBRE LA FRANJA:



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Fabricado por:

TAMINCO BVBA

Pantserschipstraat 207, 9000 Gent, Bélgica
Teléfono: +32 (9) 2541411. Fax: +32 (9) 2541410
www.taminco.com

Importado y Distribuido Por:

FMC LATINOAMERICA S.A

Calle 108 # 45 30. Torre 2 oficinas 1004 – 1005. Centro Empresarial Paralelo 108
Telefono: (+571) 6351504
Bogotá D.C – Colombia

Importado y Distribuido Por:

CLABEREP LTDA – CLABE REPRESENTACIONES COLOMBIANAS LTDA.

Autopista Medellín Km. 3.5 Costado Sur, Terminal Terrestre de Carga de Bogotá, Ofic. C36 y C37
Telefono: 8415119. Móvil: 3176449628
claberep@claberep.com

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

